



INSTRUCCIONES PARA PACIENTES QUE VAN A SER SOMETIDAS A CONIZACIÓN

La conización con radiofrecuencia es un procedimiento quirúrgico que se usa como método diagnóstico o terapéutico; se realiza en forma ambulatoria en el consultorio, bajo anestesia local, en forma muy similar a la colposcopia, extrayendo un pequeño fragmento. No es doloroso y ocasiona molestias leves.

PREPARACION	INSTRUCCIONES PARA PACIENTES DESPUÉS DE LA CONIZACIÓN
<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de NO estar en embarazo. En caso de tener sospecha comuníquese al Ginecólogo.• En caso de estar tomando aspirina, aspirineta, mejoral, anticoagulantes o medicamentos similares, por favor comunicarle al Ginecólogo inmediatamente ya que estos medicamentos deben suspenderse al menos ocho días antes del procedimiento.• Idealmente no debe estar menstruando• No necesita ningún tipo de ayuno.• Si tiene dispositivo intrauterino como método de planificación, este le será retirado el día del procedimiento.• Puede ingerir de 400 a 800 mg. de Ibuprofeno, 2 horas antes de la cita siempre y cuando el medicamento no esté contraindicado (alergia - embarazo).• El procedimiento es de corta duración y muy raramente ocurren complicaciones.• La complicación más frecuente e importante es el sangrado.• La paciente sale inmediatamente para la casa y se le deja una gasa en la vagina hasta el día siguiente.	<ul style="list-style-type: none">• Retirar la gasa según la recomendación• Si presenta un sangrado abundante, con coágulos, consultar por urgencias para que coloquen una nueva gasa compresiva hasta el día siguiente.• Tomarse los medicamentos ordenados de la forma en que dice la fórmula• No tener relaciones sexuales por 20 días• No hacer ejercicio (Deporte) por una semana.• Recuerde que es normal presentar flujo aguado y sanguinolento el primer mes.• Si presenta algunas molestias, puede tomar ibuprofeno de 400 mg, una tableta cada ocho horas durante 1 o 2 días.• Asistir a la revisión el día que se le indicó para reclamar el resultado de la biopsia.• En caso de presentar fiebre con dolor fuerte en la pelvis, comunicarse al servicio donde fue atendida o consultar por urgencias

Cualquier duda adicional puede consultar en la página web www.endogine.com.co, o consúltela con el ginecólogo antes del procedimiento.

Atte

Dr. Carlos Arturo Buitrago
Ginecólogo Endoscopista